

MC Groep

Baarmoederfoto HSG



Inhoudsopgave

- 1 Wat is een baarmoederfoto
- 2 Wie voert het onderzoek uit?
- 3 Wat zijn de risico's?
- 4 Voorafgaand aan het onderzoek
- 5 Waar vindt het onderzoek plaats?
- 6 Hoe verloopt het onderzoek?
- 7 Na de baarmoederfoto
- 8 Telefoonnummer

1 Wat is een baarmoederfoto?

Een baarmoederfoto of HSG (hysterosalpingogram) is een röntgenonderzoek om te kijken of uw eileiders doorgankelijk zijn. Daarbij wordt er ook gekeken of de baarmoeder en de baarmoederholte normaal van vorm zijn. U krijgt via een speculum (eendenbek of spreider) een cupje op de baarmoedermond geplaatst. Via dit cupje wordt contrastmiddel ingespoten. Deze vloeistof is zichtbaar op een röntgenfoto en zo kunnen wij beoordelen of de vloeistof goed door de eileiders loopt.

2 Wie voert het onderzoek uit?

De baarmoederfoto wordt uitgevoerd door de dienstdoende gynaecoloog van die dag, samen met een laborant van de afdeling radiologie en een radioloog.

3 Wat zijn de risico's?

- Infectie. Tijdens de baarmoederfoto mag u geen Chlamydia hebben omdat u dan kans hebt op een eileiderontsteking. Daarom zullen wij van te voren altijd een kweek van de baarmoedermond afnemen waarbij we testen op

chlamydia.

- Allergische reactie op het contrastmiddel. Als u allergisch bent voor jodium moet u dat direct doorgeven bij de planning van de afspraak, er zit namelijk jodium in het contrastmiddel.

Nota bene:

De baarmoederfoto wordt afhankelijk van uw menstruele cyclus afgesproken. Dit is van groot belang omdat u ten tijde van de baarmoederfoto niet zwanger mag zijn. Een beginnende zwangerschap kan namelijk door het spuiten van contrastmiddel worden verstoord. Als u hier niet zeker van bent wordt de foto niet gemaakt. Dit betekent dat u vanaf de menstruatie tot en met de foto geen gemeenschap of beschermd gemeenschap moet hebben. Ook mag het onderzoek niet plaatsvinden tijdens bloedverlies. Het ideale moment om de baarmoederfoto te maken is dus als de menstruatie voorbij is, maar nog vóór de eisprong heeft plaatsgevonden. In overleg kunt u de anticonceptiepil starten om de planning te vereenvoudigen. Verliest u nog enkele druppels menstruatiebloed? Dit is niet

erg, u hoeft ons hiervoor niet te bellen. Als u nog echt menstrueert kan het onderzoek niet doorgaan. Neemt u dan contact met ons op.

4 Voorafgaand aan het onderzoek

Neem 1 uur voor uw afspraak 1 tablet Naproxen 500 mg in, dit is een pijnstillertje. Deze krijgt u van te voren van de fertilitateits verpleegkundige.

5 Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Deze bevindt zich op de begane grond, na binnenkomst via de hoofdingang gaat u bij de liften rechtsaf. U volgt deze gang totdat u aan uw linker hand de afdeling Radiologie ziet.

6 Hoe verloopt het onderzoek?

De laborant haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar een kleedkamertje waar u de onderkleding uit kunt doen. Ondertussen belt de laborant de gynaecoloog. U gaat op een onderzoekstafel liggen met de benen in de beensteunen. Hierna wordt het speculum ingebracht. De vagina en baarmoedermond

worden ontsmet met jodium en er wordt een cupje geplaatst op de baarmoedermond. Soms lukt het niet het cupje te plaatsen, dan zal het vervangen worden door een ander instrument.

Daarna zal de radioloog worden gebeld en wordt de röntgenbuis boven uw onderbuik ingesteld. Via het cupje wordt de contrastvloeistof ingespoten. Dit kan even pijnlijk zijn, te vergelijken met heftige menstratiekrampen.

Het onderzoek duurt ongeveer een kwartier. Het grootste deel is voorbereiden, het inspuiten van de contrastvloeistof duurt tussen de 10 tot 30 seconden. Soms komt er onvoldoende contrastvloeistof in de baarmoeder. Het kan dan ook nodig zijn om het cupje te vervangen door een ander instrument. Na afloop kijkt de arts samen met u naar de foto's op het scherm. De arts vertelt u direct of er afwijkingen te zien zijn.

Na het onderzoek krijgt u een maandverband, omdat er contrastvloeistof kan lekken. De contrastvloeistof voelt plakkerig aan.

7 Na de baarmoederfoto

Na de baarmoederfoto kunt u

1 of 2 dagen lichte pijn in de onderbuik houden. Wij raden u daarom aan iemand mee te nemen, die u na het onderzoek naar huis kan brengen.

U kunt zo nodig een pijnstiller nemen (Paracetamol). Er kan ook sprake zijn van wat afscheiding of gering bloedverlies.

Meestal heeft u al een vervolgspraak gekregen met de gynaecoloog om het verdere beleid te bespreken. Indien u nog geen afspraak heeft neem dan contact met ons op.

Als beide eileiders dicht lijken of er is twijfel over de doorgankelijkheid, dan kan het zijn dat wij u adviseren om een kijkoperatie (laparoscopie) te ondergaan. Dit zal dan door de gynaecoloog met u worden besproken.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u daarmee uiteraard terecht bij uw behandelend arts of bij de fertiliteitsverpleegkundige.

8 Telefoonnummer

MC Zuiderzee, Lelystad

tel: 0320-271301

09.00-17.00 uur

Ruimte voor vragen

Ruimte voor vragen

| | | | |
|---|--|--|---|
| MC Zuiderzee Ziekenhuisweg 100 8233 AA Lelystad (0320) 271 911 www.mczuiderzee.com | MC Emmeloord Urkerweg 1 8303 BX Emmeloord (0527) 63 76 37 www.mcemmeloord.com | MC Dronten Het Zwarte Water 77 8253 PD Dronten (0320) 271 911 www.mcdronten.com | Polikliniek Urk Gezondheidscentrum Het Dok Vlechttuinen 1 8322 BA Urk |
|---|--|--|---|