

Myosure behandeling



- 1** **inleiding**
- 2** **Vorbereiding**
- 3** **De Myosure
behandeling**
- 4** **Na de Myosure
Behandeling**
- 5** **Risico's van de
Myosure behandeling**
- 6** **Belangrijk**
- 7** **Complicaties**
- 8** **Route**
- 9** **Vragen**

1 Inleiding

U heeft een afspraak met de gynaecoloog voor de MyoSure behandeling. MyoSure is een eenvoudige behandeling voor het verwijderen van vleesbomen (myomen), poliepen of een rest van een placenta (moederkoek) zonder in de baarmoeder en baarmoederwand te snijden. Met een camera (hysteroscoop) wordt in de baarmoeder gekeken waar de afwijking zich bevindt en deze kan daarna worden verwijderd met de MyoSure. De MyoSure behandeling vindt poliklinisch plaats, waardoor u direct na de behandeling naar huis kunt.

Met de myosure kunnen verschillende ingrepen worden verricht:

- Verwijderen van myomen (vleesbomen). Myomen zijn goedaardige spierknobbels. Zij kunnen aanwezig zijn aan het buitenoppervlak van de baarmoeder, in de spierwand of aan de binnenkant van de baarmoeder, uitpuilend in de baarmoederholte. Een myoom dat uitpuilt

in de baarmoederholte veroorzaakt dikwijls menstruatie-problemen. Alleen myomen die voor een (groot) deel in de baarmoederholte liggen, zijn met een myosure behandeling te verwijderen.

- Verwijderen van poliepen
Poliepen zijn uitstulpingen van het slijmvlies van de baarmoeder.
- Verwijderen van een rest van een placenta.
Soms blijft er na een bevalling, een miskraam of een zwangerschapsafbreking een deel van de placenta achter in de baarmoeder.

2 Voorbereiding

De avond voor, en een uur voor de behandeling neemt u een tablet Naproxen 500 mg en een paracetamol 500 mg in. Het recept hiervoor heeft u tegelijkertijd met uw afspraak voor de MyoSure behandeling gekregen. Dit medicijn vermindert de kramp tijdens en na de behandeling.

Als u menstruaties heeft, vindt de behandeling in de

eerste helft van de cyclus (vóór de eisprong) plaats, zodat u niet zwanger kunt zijn ten tijde van het onderzoek en er geen dik slijmvlies aanwezig is. Hiermee moet u bij het maken van de afspraak rekening houden.

3 De Myosure behandeling

De MyoSure behandeling vindt plaats in de behandelkamer van de polikliniek Gynaecologie en duurt over het algemeen tien tot twintig minuten. Indien nodig kunt u een plaatselijke verdoving krijgen. Uw partner mag bij de behandeling aanwezig zijn. U heeft eerst nog een kort gesprek met de gynaecoloog. Daarna doet u uw onderkleding uit en neemt plaats op een gynaecologische stoel. Een verpleegkundige legt u uit wat er gebeurt en wat u kunt verwachten.

De gynaecoloog brengt via de vagina een kleine camera in om de binnenkant van de baarmoedermond en baarmoeder te bekijken. Vervolgens brengt de gynaecoloog het instrument in om de myoom/poliep/placentarest

in de baarmoeder te verwijderen. Via een opening aan de zijkant aan het uiteinde van het instrument snijdt de gynaecoloog het myoom of de poliep in kleine stukjes weg. Het weefsel wordt gelijk via het instrument opgezogen en uit de baarmoeder verwijderd. Als het myoom, de poliep of de placentarest volledig verwijderd is, haalt de gynaecoloog het instrument uit de baarmoeder. Van het weefsel verwijderen zelf voelt u niets. U voelt het krampen van de baarmoeder doordat de baarmoeder wat oprekt door het vocht dat er in gebracht wordt, wat u als pijnlijk kunt ervaren.

4 Na de Myosure behandeling

Na de behandeling kleedt u zich weer aan. U kunt nog vocht uit de vagina verliezen, waarvoor u een maandverband kunt gebruiken. Als u zich goed voelt, kunt u meteen naar huis. U kunt eventueel even tot rust komen in een aparte ruimte. U krijgt een afspraak voor controle mee.

Indien nodig neemt u vier en acht uur na de ingreep nogmaals een tablet

Naproxen 500 mg en paracetamol 500 mg in. Het recept hiervoor heeft u tegelijkertijd met uw afspraak voor de MyoSure behandeling gekregen.

5 Risico's van de Myosure behandeling

Risico's van de behandeling zijn perforatie van de baarmoeder, bloedingen en infecties van de baarmoeder. Lichte krampen en licht ongemak kunnen na de behandeling optreden. Bij vloeistofoverbelasting (als er te veel vocht uit de baarmoeder in uw bloedbaan komt) wordt de behandeling gestaakt, zo nodig wordt dan nog een tweede behandeling gepland.

6 Belangrijk

- U kunt last krijgen van een krampende pijn van de baarmoeder.
- De eerste dag na de behandeling kunt u wat helderrood bloedverlies als gevolg van het inbrengen van de MyoSure en het verwijderen van het weefsel hebben.
- Daarna heeft u waterige/bloederige

afscheiding. Dit duurt enkele dagen tot twee weken.

- De meeste vrouwen kunnen binnen een à twee dagen hun normale activiteiten weer hervatten.
- Zodra u niet meer vloeit kunt u weer:
 - in bad gaan
 - geslachtsgemeenschap hebben
- Na de behandeling blijft eventuele anticonceptie nodig.

7 Complicaties

U moet de behandelend arts bellen indien:

- U meer dan 38 graden koorts heeft.
- De bekkenpijn verergert en voorgeschreven medicijnen niet helpen.
- U misselijk, kortademig of duizelig bent.
- U darm- of blaasproblemen krijgt.
- U een onaangenaam ruikende groene vaginale afscheiding heeft.

Krijgt u de eerste veertien dagen na de behandeling problemen die te maken hebben met de behandeling? Neem dan contact op met het ziekenhuis:

- Op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur belt u met de polikliniek van uw gynaecoloog, telefoonnummer 0320-271301.
- Buiten deze tijden belt u met de afdeling gynaecologie, telefoonnummer 0320-271345.

8 Route

U vindt de behandelkamer van de gynaecologie tijdelijk op de polikliniek Dermatologie. Meldt u zich daar bij de balie.

9 Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. De polikliniek Gynaecologie is op werkdagen te bereiken op telefoonnummer 0320-271301.

Ruimte voor vragen

MC Zuiderzee
Ziekenhuisweg 100
8233 AA Lelystad
(0320) 271 911
www.mczuiderzee.com

MC Emmeloord
Urkerweg 1
8303 BX Emmeloord
(0527) 63 76 37
www.mcemmeloord.com

MC Dronten
Het Zwarte Water 77
8253 PD Dronten
(0320) 271 911
www.mcdronten.com

Polikliniek Urk
Gezondheidscentrum
Het Dok
Vlechttuinen 1
8322 BA Urk